


FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA "CAJA DE SALUD CORDES"



<p>Para ser atendido en cualquier establecimiento de la Caja de Salud CORDES el paciente debe usar Barbijo obligatoriamente y lavarse las manos antes de ingresar al establecimiento.</p>	<p>Todo personal en contacto con pacientes debe usar EPP y cumplir todos los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.</p>	<p>Tratamiento Ambulatorio Domiciliario Reposo en casa (cuarentena familiar), aumento de consumo de líquidos, antitusígenos, antipiréticos y analgésicos (paracetamol, AINES) no debe emplear IBUPROFENO.</p>		
<p>PROTOCOLO DE ETIQUETA RESPIRATORIA: Cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, usando toallas de papel, las cuales deben descartar directamente hacia un tacho. De no contar con pañuelos, cubrir la nariz y la boca con el brazo o la parte interna de la flexura del codo. Efectuar la higiene de las manos con agua y jabón, después de estar en contacto con secreciones respiratorias.</p>	<p>SIGNOS DE ALARMA NIÑO: Fiebre >39°C y dificultad para respirar. Aumento de la FR: entre 2m y 11m: >50X' entre 1ª y 5a >40X'. Cianosis, rechazo vía oral, signos de rehidratación, irritabilidad y/o convulsiones, trastornos del estado de conciencia. ADULTO: Dificultad para respirar o dolor en el pecho, cianosis, vómito o diarrea persistente, signos de deshidratación, trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca, agravamiento de una enfermedad crónica, hipertensión arterial.</p>	<p>FACTOR DE RIESGO: Menor de 5 años, mayor riesgo en <2 años. Adultos > de 60 años. Mujeres embarazadas. Personas con las siguientes condiciones: EPOC, cardiovascular, rena hepática, hematológica, neurológica, neuromuscular o metabólica. Cáncer Inmunosupresión: personas >19 años con TTO prolongado con AAS, residentes de casas de reposo u otros de cuidados crónicos.</p>	<p>Indicar a los asegurados que deben mantener distancia de al menos un metro de otras personas.</p>	